

¿Qué es una infección del oído?

- La infección del oído también se llama otitis media aguda.
- Las infecciones del oído son más comunes en los niños pequeños.
- Las infecciones del oído pueden ocasionar fiebre, dolor de oído, falta de sueño, irritabilidad y, a veces, secreción en el oído. Los bebés pueden halarse o tirar de las orejas.
- Las infecciones de oído pueden ser causadas por virus o por bacterias.



¿Qué debo hacer para que mi hijo se mejore?

- El personal de atención médica le dirá si su hijo necesita antibióticos.
- Los medicamentos como el ibuprofeno o acetaminofén, también conocidos como Tylenol® o Advil®, pueden aliviar el dolor de oído o la fiebre.
 - Consulte con el personal de atención médica sobre la cantidad de medicamento que su hijo debe tomar.
 - Estos medicamentos deben aliviar los síntomas de su hijo, pero en algunos casos puede necesitar también antibióticos.

¿Cuándo se sentirá mejor mi hijo?

- Si le recetan antibióticos a su hijo, los síntomas empezarán a mejorar dentro de 3 días.

Comuníquese con el personal de atención médica si:

- Su hijo no empieza a mejorar dentro de 3 días después de empezar el tratamiento.
- Su hijo está más irritable o somnoliento, tiene fiebres altas persistentes, está vomitando o tiene dolor o hinchazón detrás del oído.

El propósito de este documento es proporcionar información relacionada con la salud para que esté mejor informado. No sustituye la consulta de su médico y no debe basarse en este documento para el tratamiento de condiciones médicas específicas.